

Bovikalc

Overwint Melkziekte dubbel en dwars

Bovikalc bevat 2 x zoveel kalk als conventionele middelen

Het calcium gehalte van uw melkzieke koe is dus snel weer op het gewenste niveau.

Bovikalc komt vrij in 2 fases (onmiddellijk + geleidelijk)

Daardoor heeft het een langere werking en beperkt u de kans op herhaling.

Toediening

Bij voorkomen van melkziekte: 4 boli

Bolus 1 : bij het op gang komen van de geboorte

Bolus 2 : onmiddellijk na het kalven

Bolus 3 : 12 à 15 uur na bolus 2

Bolus 4 : 12 à 15 uur na bolus 3

Bij behandeling van melkziekte: 2 boli

Bolus 1 : 2 à 3 uur na het calcium infuus


Bolus 2 : 12 à 15 uur na bolus 1

Bovikalc

Overwint Melkziekte dubbel en dwars

Bovikalc bevat
2 x zoveel kalk
als conventionele
middelen

Bovikalc komt
vrij in **2** fases
(onmiddellijk +
geleidelijk)



ZA/2007/09090

DEZE BROCHURE WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Melkziekte is een belangrijke economische schadepost

Kalfziekte of melkziekte (in deze folder verder melkziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte bij melkkoeien. Het wordt veroorzaakt door een acuut gebrek aan calcium in het bloed dat kort vóór of na het afkalven optreedt. Het komt voor in 5 à 7 % van de gevallen, maar verschild afhankelijk van ras, leeftijd, melkproductie, voeding en lengte van de droogstand. Melkziekte brengt zware directe en indirecte financiële schade met zich mee.

Een liggende koe heeft niet altijd melkziekte!

Een zieke koe vertoont duidelijke tekenen. Maar opgelet, deze zijn niet altijd specifiek voor melkziekte. Ook andere aandoeningen kunnen dezelfde symptomen teweegbrengen. Alleen uw dierenarts kan door een precieze diagnose de juiste behandeling adviseren. Ook voor preventieve maatregelen kunt u het best uw dierenarts raadplegen.



Wat zijn de zichtbare symptomen van melkziekte?

De zichtbare symptomen van melkziekte zijn als volgt:

- de eerste tekenen zijn trillingen, daarna wankelen
- eetlust, herkauwen en ontlasting verminderen of houden volledig op
- de koe gaat liggen, vaak met de kop in de flank, is sloom en haar lichaams-temperatuur kan aanzienlijk dalen
- zonder behandeling raakt de koe in coma en tenslotte sterft ze.


De sleutel tot succes: een aangepaste preventieve en curatieve strategie

Het risico op melkziekte wordt sterk vermindert door een weloverwogen preventieve én curatieve strategie. Hiervoor is een grondige kennis en observatie van uw dieren noodzakelijk. Vervolgens het gebruik van doeltreffende en veilige producten, toegediend op het juiste moment. Uw dierenarts is hiervoor de beste adviseur. Hij zal u helpen bij het vinden van een doeltreffende strategie, teneinde de kosten verbonden aan deze ziekte te verminderen.

Bovikalc®; innovatief

Bovikalc® is innovatief omdat dit het eerste calciumsupplement is in de vorm van een bolus. Het is zeer veilig in het gebruik, en heeft een unieke samenstelling en toedieningswijze. Door de bijzondere samenstelling van Bovikalc® komt de calcium zowel onmiddellijk als ook geleidelijk beschikbaar. Bovikalc® wordt zowel preventief als ter aanvulling van een calcium infuus aangeraden.

Wat zijn de voordelen van Bovikalc®?



Indien de bolus volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegediend.

Bovikalc®; toediening met een handige bolusschietier

Speciaal voor Bovikalc® is er een handige bolusschietier ontwikkeld. Hiermee is Bovikalc® makkelijk en veilig toe te dienen. Deze bolusschietier is verkrijgbaar bij uw dierenarts.

