




GMF+ FSA-geborgd
GMF+ FSA assured
Garanti GMF+ FSA

Erkenningssnr. Product
Registrations-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
Zulassungs-Nr. Hersteller
wFR47280058
PDV103322


Toppro: registered trademark of
bio enterprise
agro specialist
Bio Enterprise B.V
Sluisdijk 3, 7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl



Magnesium

Vermindert het risico op tetanie
Reduces the risk of tetany
Réduit le risque de tétanie
Verringert das Risiko von Tetany

12 x 95 g



it's about details

Magnesium



12 x 95 g



Mineraal dietvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico van tetanie (hypomagnesemie of kopziekte).

Werkingsduur
1 maand.

Toepassing
De Topro Magnesium Bolus met een langzame afgifte die toegediend wordt aan rundvee bij het uitweiden in de lente.

Samenstelling
Magnesiumoxide, ijzer (ballast), plantaardige vetten, magnesiumstearaat.

Analytische bestanddelen
Suikers 6,2 %, Zetmeel < 0,1 %, Calcium, Ca 1,4 %, Kalium, Ka < 0,1 %, Natrium, Na < 0,5 %, Fosfor, P < 0,5 %, Magnesium, Mg 42 %

Dosering

- 2 bolussen in één keer ingeven.
- Indien nodig kunnen 1 maand later nog een keer 2 bolussen gegeven worden.
- Niet toedienen aan runderen beneden de 400 kg. Gebruik hiervoor de Junior Bolus.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Aanbevolen wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen met betrekking tot het evenwicht van het dagelijks rantsoen en de opname van vezels en gemakkelijk beschikbare energiebronnen.

Bewaren
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 40 g magnesium.



Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of tetany (hypomagnesemia or grass tetany).

Active duration
1 month.

Application
The Topro Magnesium bolus with slow release is administered to cattle let out to pasture in the spring.

Composition
Magnesium oxide, iron (ballast), vegetable fats, magnesium stearate.

Analytical constituents and amounts
Sugars 6.2%, Starch <0.1%, Calcium, Ca 1.4%, Potassium, K <0.1%, Sodium, Na <0.5%, Phosphorus, P <0.5%, Magnesium, Mg 42%

Dosage

- Administer 2 boluses at the same time.
- If necessary, administer 2 more boluses 1 month later.
- Not to be used for cattle lighter than 400 kg.

Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- We recommend consulting a veterinarian or nutritionist in relation to balanced daily feed rations and the absorption of fibres and readily bioavailable energy sources.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 40 g magnesium.



Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung der Gefahr von Tetany (Hypomagnesemia).

Dauer
1 Monat.

Anwendung
Das Topro Magnesium Bolus mit langsamer Freisetzung wird bei der Beweidung im Frühjahr an Rinder verabreicht.

Zusammensetzung
Magnesiumoxid, Eisen (Ballast), Pflanzliche Fette, Magnesiumstearat.

Analytische Bestandteile
Zuckers 6,2 %, Stärke < 0,1 %, Calcium, Ca 1,4 %, Kalium, Ka < 0,1 %, Natrium, Na < 0,5 %, Phosphor, P < 0,5 %, Magnesium, Mg 42 %

Fütterung

- 2 Boli gleichzeitig verabreichen
- Falls erforderlich 1 Monat später wieder 2 Boli verabreichen.
- Nicht verwenden bei Tieren unten 400 kg. In diesem Fall den Junior Bolus verabreichen.

Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu der Ausgewogenheit der täglichen Ration und die Aufnahme von Faser und leicht verfügbaren Energiequellen.

Lagerung
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 40 g Magnesium.



Aliment minéral diététique pour bovins en forme de bolus pour administration orale, a fin de réduire le risque de tétanie (hypomagnésémie).

Durée d'action
1 mois.

Application
Le bolus de Magnésium Topro à effet retard à donner aux bovins lors de la mise à l'herbe en printemps.

Composition
Oxide de magnésium, fer (ballast), matières grasses végétales, stéarate de magnésium.

Constituants analytiques
Sucres 6,2 %, Amidon < 0,1 %, Calcium, Ca 1,4 %, Potassium, Ka < 0,1 %, Sodium, Na < 0,5 %, Phosphore, P < 0,5 %, Magnésium, Mg 42 %

Dosage


- 2 bolus en une seule fois.
- Si nécessaire administrer encore une fois 2 bolus 1 mois plus tard.
- Ne pas administrer au bétail de moins de 400 kg. Utiliser le Bolus Junior à cet effet.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale en ce qui concerne l'équilibre de la ration journalière et l'inclusion de fibres et les sources d'énergie disponibles facilement.

Conserver
Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 40 g de magnésium.



Tenminste houdbaar tot
zie verpakking
Best before
see packaging
Mindestens haltbar bis
siehe Verpackung
Date limité de conservation
voir emballage

Batchnr.
zie verpakking
Batch No.
see packaging
Batch-Nr.
siehe Verpackung
No de lot
voir emballage