

Werking

Diarree leidt tot uitdroging en bloedverzuring. Het kalf verliest zijn eetlust en drinkt minder. Natriumbicarbonaat buffert de verzuring (pH) en zet het kalf aan tot meer drinken.

Gebruiksaanwijzing en dosering

- 1 bolus per kalf bij de eerste tekenen van diarree.
En opnieuw 1 bolus na de volgende 3 voedingen.
- Toedienen met een geschikte bolusschieter.
- Aanbevolen wordt om vóór het gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen.



it's about details

Bica

Mineraalvoeder voor kalveren in de vorm van een bolus voor orale toediening.

20 x 15 g



Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot zie verpakking

Batchnr.
zie verpakking

Erkenningsnr. producent
α FR2414501

PDV103322

GMP+ FSA-geborgd

Samenstelling

Natriumbicarbonaat (90 %), plantaardige vetten, calciumstearaat.

Analytische bestanddelen

Calcium, Ca 0,1 %, Fosfor, P 0,0 %, Natrium, Na 24,3 %, Magnesium, Mg 0,0 %

Topro: registered trademark of



bio enterprise
agro specialist

Bio Enterprise B.V.

Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl