

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 10 december 2010 tot verlenging van de toelating van het middel P3-ansep chloortabletten, toelatingnummer 6377 N

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte van Aujeszky en mond- en klauwzeer virus:

- op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard;
- in ruimten, bestemd voor verblijf van mensen, echter met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
- in dierverslijfplaatsen en bijbehorende ruimten;
- in transportmiddelen voor dieren.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.

De minimale inwerkingstijd is 5 minuten.

Onder laboratoriumomstandigheden is het middel in een concentratie van 10 tabletten per 10 liter water en bij een Minimale inwerkingstijd van 5 minuten werkzaam gebleken tegen klassieke varkenspest virus, tegen het virus van de ziekte van Aujeszky en tegen mond- en klauwzeer virus.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingsduur nat blijven.

Toepassingsgebieden en doseringen

Desinfectie van melkmachines, melkleidingsystemen, melkkoeltanks en materialen op de boerderij.

Dosering: 1 tablet per 10 liter water (150 ppm actief chloor)

Desinfectie van oppervlakken en materialen, die direct met levensmiddelen in aanraking komen in de gehele voedings- en genotmiddelenindustrie.

Algemene desinfectie van vloeren, tafels, materialen, sanitair (o.a. toiletten, closetpotten, spoelbakken) enz.

Dosering: 1 tablet op 15 liter water (100 ppm actief chloor)

Dierverslijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

Dosering: 5 tabletten per 10 liter water (750 ppm actief chloor).

Transportmiddelen voor dieren

De ontsmetting is vooral gericht op de bestrijding van een aantal besmettelijke veeziekten, zoals bedoeld in de Veewet. Voor de ontsmetting moet grondig worden gereinigd. De ontsmettingsoplossing wordt gemaakt door 10 tabletten per 10 liter water op te lossen.

Deze oplossing over de gereinigde oppervlakken (vloeren en wanden) verspreiden en minimaal 5 minuten laten inwerken.

Oppervlakken die met voedingsmiddelen in aanraking komen, naspoelen met schoon water.

Waarschuwingen:

- Verneveling van het middel is niet toegestaan.
- Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
- Toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen.
- Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.