

Udder bolus



Artikelnummer
102055

Aanvullend diervoeder

Diersoort
rundvee

Inhoud
4 stuks x 90 g

**Erkenningsnummer
producent**
α FR24037002

GMP021562

GMP+ FSA-geborgd

Mastitis

Mastitis, ofwel uierontsteking, is de meest voorkomende aandoening bij melkkoeien. Mastitis betekent letterlijk: ontsteking van het uierweefsel. Dit kan door verschillende bacteriën worden veroorzaakt waaronder E coli, Staphylococcus aureus en Streptococcus uberis. Voor de melkveehouder vormt het een grote schadepost omdat de melkproductie daalt, veelal antibiotica wordt ingezet, de melk hierdoor niet kan worden geleverd en er een boete volgt bij overschrijding van het tankcelgetal.

We kennen twee verschijningsvormen, namelijk klinische mastitis en subklinische mastitis. Klinische mastitis is goed zichtbaar (rood uier, vlokken in de melk), subklinische mastitis is minder goed zichtbaar ondanks dat er wel een ontsteking gaande is. Het celgetal van de betreffende koe is dan ook een manier om subklinische mastitis op te sporen. Subklinische mastitis kan zich ontwikkelen tot klinische mastitis. Daarom is het belangrijk om subklinische mastitis te behandelen en hiermee problemen te voorkomen.

Topro Udder bolus

Voor de behandeling van subklinische mastitis is de Topro Udder bolus ontwikkeld. Deze bolus bestaat uit een goed bestudeerd evenwicht tussen essentiële oliën van knoflook, kruidnagel en eucalyptus. Deze ingrediënten hebben een antibacteriële werking maar ook een sterk ontstekingsremmend effect. Deze bolus heeft een werkingsduur van 21 dagen.

Samenstelling

Magnesiumoxide, plantaardige vetten van koolzaad, calciumstearaat.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit.....	0 %
Ruw vet.....	15,4 %
Ruwe celstof.....	0 %
Ruwe as.....	77 %
Vocht.....	2,4 %
Magnesium, Mg.....	37,2 %
Natrium, Na.....	0 %
Calcium, Ca.....	3,6 %
Fosfor, P.....	0 %

Toevoegingsmiddelen


Mengsel van (natuurlijke) aromatische stoffen (9%).

Bewaaraadvies

- Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.
- Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Gebruiksaanwijzing

- Melkvee: 1 bolus bij verhoging van het celgetal.
- 1 bolus bij wijze van preventie op het moment van droogzetten.
- 1 bolus bij wijze van preventie 1 week voor het afkalven.
- Kan ook worden ingezet bij koeien met verminderde eetlust, energietekort of tijdens herstel na ziekte.
- Niet toedienen aan runderen beneden de 400 kg.



- Toedienen met een aangepaste bolusschietert.





Udder bolus

Producteigenschappen

Essentiele oliën van knoflook, kruidnagel en eucalyptus	Antibacteriële werking Ontstekingsremmend Verbeterd gezondheids- toestand van het uier Melk kan gewoon worden geleverd Er hoeft geen antibiotica worden gebruikt
Bolus	Makkelijk toe te dienen Verzekert van opname