



**Ondersteuning nodig bij risico op leververvetting en slepende melkziekte?**

## BOLIFAST<sup>®</sup> PHYSIOLOGIC




### Preventie van slepende melkziekte:

- **Nutritionele ondersteuning** van de leverfuncties met o.a. pensbestendige methionine en choline
- **Bescherming** van de lever tijdens de NEB
- **Ondersteuning** van de lever wanneer het risico op slepende melkziekte hoog is
- **Vorbereiding** op de volgende melkproductie
- **Vorbereiding** op de komende kalving

#### Dosering en verpakking:

- 2 bolussen per koe, 10 tot 15 dagen voor afkalven
- 1 doos omvat 12 bolussen = 6 dierbehandelingen



- **1 bruisende bolus** die zorgt voor een snelle vrijstelling en opname van de bestanddelen binnen enkele minuten
- **1 bolus met gecontroleerde vrijstelling** die zorgt voor een progressieve vrijstelling van de bestanddelen gedurende enkele uren

→ **Levert hoge gehalten op bloedniveau !**

### Enkele belangrijke feiten :

**30 % VAN HET MELKVEE HEEFT  
PROBLEMEN MET SLEPENDE MELKZIEKTE  
= BHB > 12,5 mg/dl bloed**

**GEDAALDE  
MELKPRODUCTIE**

Vaars: **-500 kg melk** / lactatie  
Koe: **-300 kg melk** / lactatie

**VRUCHTBAARHEIDS-  
PROBLEMEN**

Inseminatie **22 dagen** uitgesteld  
Slaagkans inseminatie **-20%**