

Benfital®Plus

Aanvullend diervoeder voor kalveren in geval van spijsverteringsstoornissen (diarree) of risico daarop.

Benfital®Plus dient ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans

3 kg

Samenstelling:

Ruw eiwit	3,2%
Ruw vet	5,6%
Kalium	1,3%
Ruwe celstof	2,5%
Calcium	> 0,1%
pH (100 g/2 ltr. water)	7,6
Chloride	3,8%
As	14,0%
Glucose	57,0%
Natrium	4,2%
Water	3,2%

Benfital®Plus bevat hoofdzakelijk elektrolyten en gemakkelijk absorbeerbare koolhydraten.

Ingrediënten: glucose (57%), citrus pulp (15%), natriumchloride (5%), geïnactiveerde gist (2%), kaliumchloride (2%).

Toevoegingsmiddelen: lecithine (6%), Na-bicarbonaat (4%), silicium dioxide (3%), Na-acetaat (2%), Na-citraat (2%), glycine (1%), xanthan gom (1%), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen (0,2%), ethoxiquine (60ppm).

Netto gewicht: 3000 g

Dosering en wijze van gebruik: Meng voor kalveren met diarree 100 g Benfital®Plus (2 maatschepjes) met 2 liter lauwwarm water (35-40°C) en voer dit direct. Meng voor grotere

kalveren (>60 kg) of ernstig uitgedroogde dieren 150 g Benfital®Plus (3 maatschepjes) in 3 liter lauwwarm water. Voer de toe bereide Benfital®Plus 2 of 3 maal daags in plaats van de melkvoeding. In de meeste gevallen zal de darmfunctie na 24 uur gestabiliseerd zijn. Als dit niet het geval is, ga dan door met het 2 of 3 maal voeren van Benfital®Plus gedurende de volgende 24 uur. Indien na 48 uur geen herstel is opgetreden, wordt geadviseerd een dierenarts te raadplegen.

In gevallen van ongecompliceerde diarree en in periodes van een verhoogd risico op het optreden van diarree kan Benfital®Plus gemengd worden door de melk of de kunstmelk.

Producent:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
2100 Kopenhagen O.
Reg.no. 208-R854833

Leverancier:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
NL-1817 MS ALKMAAR
Tel: +31 (0) 72 566 24 11



Batch nr.:

Houdbaarheidsdatum:



Boehringer
Ingelheim

5314-0902

**Oplosbaar in
water en
(kunst)melk**