

it's about details



20 x 60 g

**Aanvullend  
diervoer voor  
kalveren.**  
In de vorm van een  
bruistablet voor orale  
toediening. Stabilisatie van de  
water- en elektrolytenbalans  
ter ondersteuning van de  
fysiologische spijsovertering.

**Samenstelling**  
Lactose, natriumbicarbonaat,  
dextrose, natriumchloride,  
kaliumchloride,  
magnesiumstearaat.

**Toevoegingsmiddelen**

*Sensoriële*

toevoegingsmiddelen

Vanille aroma

**Technologische  
toevoegingsmiddelen**

E330 Citroenzuur

 **Dietic complementary  
feed for calves.** In the  
form of an effervescent tablet  
for oral administration.  
Stabilisation of water and  
electrolyte balance to support  
the physiological digestion.

**Composition**  
Lactose, sodium bicarbonate,  
dextrose, sodium chloride,  
potassium chloride,  
magnesium stearate.

**Additives**  
*Sensory additives*  
Vanilla aroma

**Technological additives**  
citric acid

**Analytical components**  
Calcium, Ca <0,1 %;  
Phosphorus, P <0,1 %;  
Sodium, Na 8,8 %

**Analytische bestanddelen**  
Calcium, Ca <0,1%; Phosphor, P <0,1%; Natrium, Na 8,8%; Magnesium, Mg <0,1%; Kalium, K 3,6%; Chloor, Cl 8,3%; Ruw Eiwit <0,5%; Ruw Vet <0,5%; Ruwe As 30,9%; Ruwe Celstof <0,5%

**Dosering**  
Los één tablet op in 2 liter warm water (ongeveer 50 °C) per maaltijd. Bij lichte verteringsproblemen de oplossing voeren tussen de melkvoedingen. Bij ernstige verteringsproblemen kan een melkvoeding vervangen worden. Herhaal gedurende 2 of 3 dagen. Dieren met een lebmaag moeten niet tegelijkertijd melk gevoed worden.

Magnesium, Mg <0,1 %, Potassium, K 3,6 %, Chlorine, Cl 8,3 % Crude protein <0,5%, Crude fat <0,5%, Crude ash 30,9%, Crude fiber <0,5%

**Dosage**  
Dissolve one tablet in 2 liters of warm water (around 50 °C) per meal. For mild digestive problems, feed the solution between milk feedings. A milk feeding can be replaced in case of serious digestive problems. Repeat during 2 or 3 days. Simultaneous feeding of milk should be avoided in animals with Abomasum.

**Instructions for use**  
• Use Topro Top Fizz in case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhea).

**Gebruiksaanwijzing**  
• Gebruik Topro Top Fizz in geval van risico op spijsovertersproblemen (diarree), tijdens en na die stoornissen.

• Aangeraden wordt om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

**Bewaaradvies**  
Droog oplaaan, beschermd tegen extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen.

**Tenminste houdbaar tot**  
Zie verpakking.

**Batchnr.**  
Zie verpakking.

 **Aliment  
complémentaire  
diététique pour veaux.** Sous forme de comprimé effervescent pour administration orale. Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique.

**Composition**  
Lactose, bicarbonate de sodium, dextrose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, stéarate de magnésium.

**Additifs**  
*Additifs Sensoriels*  
Arôme de vanille

**Additifs technologiques**  
E330 Acide citrique

**Constituants analytiques**  
Calcium, Ca <0,1%; Phosphore, P <0,1%; Sodium, Na 8,8%; Magnésium, Mg <0,1%; Potassium, K 3,6%; Chloré, Cl 8,3% Protéine brute <0,5%, Matières grasses brutes <0,5%, Cendres brutes 30,9%, Cellulose brute <0,5%

**Dosage**  
Dissolvez un comprimé dans 2 litres d'eau chaude (environ 50 °C) par repas. Pour les problèmes digestifs légers, donnez la solution entre les tétées de lait. En cas de problèmes digestifs graves, une tête peut être remplacée. Répétez pendant 2 ou 3 jours. L'administration simultanée de lait doit être évitée chez les animaux ayant une caillette.

**Mode d'emploi**  
• Utilisez Topro Top Fizz en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.  
• Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Indiquer dans les mentions d'étiquetage

**Conditions de stockage**  
Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de températures excessives, et hors de la portée des enfants.

**Date limité de conservation**  
Voir emballage.

**No de lot**  
Voir emballage.

 **Diatetisches  
Ernaehrungsfutter-  
mittel für Kälber.** In Form einer Brausetablette zur oralen Verabreichung. Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

**Zusammensetzung**  
Lactose, Natriumbicarbonat, Dextrose, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumstearat.

**Zusatstoffe**  
*Sensorische Zusatzstoffe*  
Vanille aroma

**Technologische Zusatzstoffe**  
Zitronensäure

**Analytische Bestandteile**  
Calcium, Ca <0,1%; Phosphor, P <0,1%; Natrium, Na 8,8%, Magnesium, Mg <0,1%, Kalium, K 3,6%, Chlor, Cl 8,3% Rohprotein <0,5%, Rohfett <0,5%, Rohasche 30,9%, Rohfaser <0,5%

**Fütterung**  
Pro Milchzeit eine Tablette in 2 Liter warmes Wasser (ca. 50 °C) auflösen. Bei leichten Verdauungsproblemen füttern Sie die Lösung zwischen den Milchmaßen. Bei schwierigen Verdauungsproblemen kann eine Milchnahrung ersetzt werden. Wiederholen für 2 oder 3 Tage. Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte bei Tieren mit Labmagen vermieden werden.

**Gebrauchsanweisung**  
• Verwenden Sie Topro Top Fizz im Fall von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).

• Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuhören.

**Lagerungshinweise**  
Trocken lagern, vor extremen Temperaturen schützen und außer Reichweite von Kindern lagern.

**Mindestens haltbar bis**  
Siehe Verpackung.

**Batch-Nr.**  
Siehe Verpackung.

# Top Fizz

Topro: registered trademark of  
**Bio Enterprise B.V.**  
Sluiskolk 3  
7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl www.topro.nl



Erkenningsnr. Producent  
Registration No. manufacturer  
Zulassungs-Nr. Hersteller  
No agrément du producteur  
aFR24037002

GMP+ FSA-geborgd  
GMP+ FSA assured  
GMP+ FSA gesichert  
Garanti GMP+ FSA  
GMO controlled  
PDV103322



20 x 60 g

